

Mobility-Scale-Lippe (M-S-L)

© Dr. Darius Moghtader 2021 Graphik: klossannaliska@gmail.com

ist ein Instrument zur Bestimmung **der Beweglichkeit** der Oberlippe. **Grad 0** bedeutet eine **frei bewegliche Oberlippe** und **Grad 3** eine **stark eingeschränkte Oberlippenbeweglichkeit**.

□ M-S-L Grad 0




Manuelles stressfreies Aufstülpen der Oberlippe ist vollumfänglich möglich. Die Oberlippe kann stressfrei vollständig über die gesamten Nasenlöcher gezogen werden. Die Wahrscheinlichkeit einer Behinderung beim Saugen durch das Lippenband der Oberlippe ist ausgeschlossen. Eine **Frenotomie** des Oberlippenbandes zur Verbesserung des Trinkverhaltens ist medizinisch **nicht indiziert**.*

□ M-S-L Grad 1



Das Aufstülpen der Oberlippe über die Mitte der Nasenlöcher ist stressfrei möglich. Die Wahrscheinlichkeit einer Behinderung beim Saugen durch das Lippenband der Oberlippe ist gering. Stülpt der Säugling die Oberlippe beim Stillen oder Trinken auf oder lässt sich manuell aufstülpen, ist von einer Frenotomie **abzusehen**. Auch wenn das zunächst nicht möglich ist, wird zunächst eine **abwartende** beobachtende Haltung empfohlen.*

□ M-S-L Grad 2



Das Aufstülpen der Oberlippe bis unter die Mitte der Nasenlöcher ist möglich. Dabei entsteht Stress, der sichtbar durch die weiße Verfärbung (Minderdurchblutung) des Zahnfleisches und/oder der Oberlippe wird. Die Wahrscheinlichkeit einer Behinderung beim Stillen oder Saugen durch das Lippenband der Oberlippe ist erhöht. Beim Stillen oder Trinken ist die Funktion der Oberlippe zu prüfen. Ist sie eingezogen, **kann** eine Frenotomie des Oberlippenbandes zu einer Verbesserung des Trinkverhaltens führen.*

□ M-S-L Grad 3



Manuelles und stressfreies Aufstülpen der Oberlippe ist nicht möglich. Die Oberlippe kann nicht über den Unterrand der Nasenlöcher gezogen werden. Beim Stillen oder Trinken ist der Verdacht der eingezogenen Oberlippe zu bestätigen. Die Wahrscheinlichkeit einer Problematik beim Stillen oder Saugen durch das Lippenband der Oberlippe ist hoch. Eine **Frenotomie** des Oberlippenbandes wird **wahrscheinlich zu einer Verbesserung** des Saug- bzw. Trinkverhaltens führen.*

***Vor einer Therapieentscheidung ist eine Vorstellung bei einer spezialisierten Fachperson zur Stillberatung und zum Funktionstest der Lippe und Zunge notwendig.**